

# BELIDA

## Giant Featherback *Chitala lopis*

Animalia  
Chordata  
Actinopterygii  
Osteoglossiformes  
Notopteridae  
Chitala  
*Chitala lopis*



Local name: *Pangaju* (Jawa), *lopis* (West Java), *belido* (South Sumatera, Jambi), *belidah/blidah* (West Kalimantan), *pipih* (South Kalimantan, Central Kalimantan).



### Habitat

Living in floodplain and rivers affected by tides. They can also live in swamps.



### Distribution

*Notopterus chitala* are found in Malaysia, Thailand, and Indonesia. The distribution area in Indonesia is in Sumatra, Kalimantan and Java.



### Food

This fish is a type of carnivorous fish, a predator for smaller fish, shrimp, and frogs.



### Reproduction

The fish gonad maturity is at a size of more than 50 cm with an estimated age of more than 3 years. Not all eggs are released during the spawning process which are placed on submerged stems. The peak of the spawning season occurs in the dry season.

# BELIDA

Giant Featherback

*Chitala lopis*

Animalia  
Chordata  
Actinopterygii  
Osteoglossiformes  
Notopteridae  
Chitala  
*Chitala lopis*



Pangaju (Jawa), lopis (Jawa Barat), belido (Sumatera Selatan, Jambi), belidah/blidah (Kalimantan Barat), pipih (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah).



## Habitat

Hidup di daerah banjir dan sungai yang dipengaruhi pasang surut, juga dapat hidup di perairan rawa.



## Sebaran

Keberadaan ikan ini tercatat ditemukan di Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Wilayah sebaran di Indonesia adalah di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa.



## Makanan

Ikan ini termasuk jenis ikan karnivora yang merupakan predator bagi ikan-ikan yang lain. Makanan ikan ini antara lain cacing, serangga, ikan-ikan yang lebih kecil, udang, dan katak.



## Reproduksi

Ikan belida mulai matang gonad pada ukuran lebih dari 50 cm dengan umur yang diperkirakan lebih dari 3 tahun. Tidak semua telur dikeluarkan pada saat proses pemijahan yang diletakkan pada batang yang terendam. Puncak musim pemijahan terjadi pada musim kemarau.